


# Integralregning

for B-niveau i hf



2015 Karsten Juul

# Stikordsregister

|   |            |
|---|------------|
| <b>A</b>                                |            |
| areal mellem graf og $x$ -akse.....     | 7, 8, 9,10 |
| areal mellem to grafer.....             | 11, 12     |
| arealfunktion.....                      | 5, 7       |
| <b>B</b>                                |            |
| bestemt integral .....                  | 6          |
| bestemt integral med Nspire.....        | 6          |
| bestemt integral uden hjælpemidler..... | 6          |
| <b>F</b>                                |            |
| fortolk integral.....                   | 7          |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>                             |                 |
| integrere .....                      | 2               |
| <b>K</b>                             |                 |
| kvadrant .....                       | 8               |
| <b>S</b>                             |                 |
| stamfunktion .....                   | 1, 2, 3, 4,5, 6 |
| stamfunktion med Nspire.....         | 2               |
| stamfunktion uden hjælpemidler ..... | 3               |
| stamfunktion, grafpunkt givet.....   | 4               |
| stamfunktion, tangent givet.....     | 4               |
| <b>U</b>                             |                 |
| ubestemt integral.....               | 2, 3, 6         |

## Indholdsfortegnelse

### Stamfunktion (ubestemt integral)

|   |   |
|---|---|
| 1. Hvad er en stamfunktion .....                              | 1 |
| 2. Undersøg om $g(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$ .....     | 1 |
| 3. Gør rede for at $g(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$ ..... | 1 |
| 4. En funktion har mange stamfunktioner .....                 | 2 |
| 5. Symbol for stamfunktion .....                              | 2 |
| 6. Bestem stamfunktion med Nspire .....                       | 2 |
| 7. Bestem stamfunktion uden hjælpemidler .....                | 3 |
| 8. Bestem $\int f(x) dx$ uden hjælpemidler .....              | 3 |
| 9. Find en bestemt af stamfunktionerne .....                  | 4 |
| 10. Hvad er en arealfunktion? .....                           | 5 |
| 11. Vigtig regel om arealfunktioner .....                     | 5 |

### Bestemt integral

|   |   |
|---|---|
| 12. Hvad er det bestemte integral .....               | 6 |
| 13. Udregn $\int_a^b f(x) dx$ med Nspire .....        | 6 |
| 14. Udregn $\int_a^b f(x) dx$ uden hjælpemidler ..... | 6 |

### Areal og bestemt interal

|  |    |
|--|----|
| 15. Regel om bestemt integral og areal .....               | 7  |
| 16. Bevis for regel om bestemt integral og areal .....     | 7  |
| 17. Fortolk integral .....                                 | 7  |
| 18. Kvadrant .....   | 8  |
| 19. Areal mellem graf og $x$ -akse uden hjælpemidler ..... | 8  |
| 20. Areal mellem graf og $x$ -akse med hjælpemidler .....  | 9  |
| 21. Areal mellem to grafer, 1. eksempel .....              | 11 |
| 22. Areal mellem to grafer, 2. eksempel .....              | 12 |
| 23. Areal mellem to grafer, 3. eksempel .....              | 12 |

### Andre anvendelser

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 24. Andre anvendelser ..... | 13 |
|-----------------------------|----|

Tidligere udgaver af dette hæfte har skiftet adresse til  
[http://mat1.dk/integralregning\\_for\\_b\\_niveau\\_i\\_hf\\_2012.pdf](http://mat1.dk/integralregning_for_b_niveau_i_hf_2012.pdf)  
[http://mat1.dk/integralregning\\_for\\_b\\_niveau\\_i\\_hf\\_2013.pdf](http://mat1.dk/integralregning_for_b_niveau_i_hf_2013.pdf)

# Stamfunktion (ubestemt integral)

## 1. Hvad er en stamfunktion?

$g(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$   
hvis  
 $g(x)$  differentieret giver  $f(x)$   
dvs. hvis  
 $g'(x) = f(x)$

## 2. Undersøg om $g(x)$ er stamfunktion til $f(x)$ .

### Opgave

Undersøg om  $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4x$  er en stamfunktion til  $f(x) = x^2$ .

### Besvarelse

For at undersøge om  $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4x$  er stamfunktion til  $f(x) = x^2$ ,  
vil vi differentiere  $g(x)$ :

$$g'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + 4x\right)' = \left(\frac{1}{3}x^3\right)' + (4x)' = \frac{1}{3}(x^3)' + 4 = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 + 4 = x^2 + 4 \neq f(x)$$

Da  $g(x)$  differentieret ikke giver  $f(x)$ , gælder:

$g(x)$  er ikke en stamfunktion til  $f(x)$

## 3. Gør rede for at $g(x)$ er stamfunktion til $f(x)$ .

### Opgave

Gør rede for at  $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4$  er en stamfunktion til  $f(x) = x^2$ .

### Besvarelse

For at gøre rede for at  $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4$  er stamfunktion til  $f(x) = x^2$ ,  
vil vi differentiere  $g(x)$ :

$$g'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + 4\right)' = \left(\frac{1}{3}x^3\right)' + 4' = \frac{1}{3}(x^3)' + 0 = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = x^2 = f(x)$$

Da  $g(x)$  differentieret giver  $f(x)$ , gælder:

$g(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$

## 4. En funktion har mange stamfunktioner.

En funktion har mange stamfunktioner, da en konstant differentieret giver nul:

$$\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{4}x^2\right)' = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$$

$$\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + 5\right)' = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$$

$$\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + 8\right)' = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$$


$\frac{3}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + c$  er stamfunktion til  $\frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$

uanset hvilket tal vi skriver i stedet for  $c$ .

Når vi ændrer på  $c$ , forskyder vi grafen op eller ned.

I koordinatsystemet har vi tegnet graferne for

nogle af stamfunktionerne til  $\frac{3}{2} - \frac{1}{2}x$ .



### 4.1 Regel

Hvis  $h(x)$  er en af stamfunktionerne til  $f(x)$ , så er funktionerne  $h(x) + k$  samtlige stamfunktioner til  $f(x)$ .

### 4.2 Regel

Hvis  $h(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$ , så vil stamfunktionerne til  $f(x)$  være de funktioner hvis graf vi kan få ved at rykke  $h(x)$ -grafene op eller ned.

## 5. Symbol for stamfunktion.

Symbolet  $\int f(x) dx$

betyder: stamfunktionerne til  $f(x)$

og læses: det ubestemte integral af  $f(x)$

Når vi finder ud af hvad  $\int f(x) dx$  er lig, så siger vi at vi integrerer  $f(x)$

Eksempel:  $\int (2x + 1) dx = x^2 + x + c$

## 6. Bestem stamfunktion med Nspire.

På skabelon-paletten vælger vi integralskabelonen  $\int \square d\square$

Nspire skriver kun én af stamfunktionerne:  $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln(7)}$  Vi må selv tilføje  $+ c$ :  $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln(7)} + c$

For at finde stamfunktion til

$$f(x) = 3x - \frac{2}{x}, \quad x > 0$$

skal vi efter integraltegnet angive at  $x > 0$ :

$$\int \left(3 \cdot x - \frac{2}{x}\right) dx |_{x>0} = \frac{3 \cdot x^2}{2} - 2 \cdot \ln(x)$$

**Husk** at trykke på højrepilen inden du taster den lodrette streg!

$|x > 0$  skal stå uden for

$$\int \square d\square$$

## 7. Bestem stamfunktion uden hjælpemidler.

|       |                    |                               |                        |               |       |                                |                               |
|-------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| $k$   | har stamfunktionen | $k \cdot x$                   | når $k$ er en konstant | <b>f.eks.</b> | $6$   | har stamfunktionen             | $6x$                          |
| $x$   | har stamfunktionen | $\frac{1}{2}x^2$              |                        | <b>dvs.</b>   | $x$   | har stamfunktionerne           | $\frac{1}{2}x^2 + c$          |
| $x^a$ | har stamfunktionen | $\frac{1}{a+1} \cdot x^{a+1}$ |                        | <b>f.eks.</b> | $x^3$ | har stamfunktionen             | $\frac{1}{4}x^4$              |
|       |                    |                               |                        | <b>MEN</b>    | $4^x$ | har <b>IKKE</b> stamfunktionen | $\frac{1}{x+1} \cdot 4^{x+1}$ |

|               |                    |          |               |         |            |                 |   |
|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-----------------|---|
| $x^{-1}$      | har stamfunktionen | $\ln(x)$ | i intervallet | $x > 0$ |            |                 |   |
| $\frac{1}{x}$ | har stamfunktionen | $\ln(x)$ | i intervallet | $x > 0$ | <b>MEN</b> | $\frac{1}{2-x}$ | har <b>IKKE</b> stamfunktionen $\ln(2-x)$ |
| $e^x$         | har stamfunktionen | $e^x$    |               |         |            |                 |   |

|               |                |                    |                           |             |        |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|
| Hvis:         | $f(x)$         | har stamfunktionen | $F(x)$                    |             |        |
| så:           | $k \cdot f(x)$ | har stamfunktionen | $k \cdot F(x)$            |             |        |
| <b>f.eks.</b> | $12x^3$        | har stamfunktionen | $12 \cdot \frac{1}{4}x^4$ | <b>dvs.</b> | $3x^4$ |

|               |                   |                      |                               |               |         |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| Hvis:         | $f(x)$            | har stamfunktionen   | $F(x)$                        | og            |         |
|               | $g(x)$            | har stamfunktionen   | $G(x)$                        |               |         |
| så:           | $f(x) + g(x)$     | har stamfunktionen   | $F(x) + G(x)$                 |               |         |
|               | $f(x) - g(x)$     | har stamfunktionen   | $F(x) - G(x)$                 |               |         |
| <b>f.eks.</b> | $6 - e^x$         | har stamfunktionerne | $6x - e^x + c$                |               |         |
| <b>f.eks.</b> | $x + \frac{1}{x}$ | har stamfunktionerne | $\frac{1}{2}x^2 + \ln(x) + c$ | i intervallet | $x > 0$ |

Advarsel: Man kan **IKKE** integrere et udtryk ved at integrere hver del af udtrykket (bortset fra visse specielle tilfælde), f.eks.

|                   |                                |                            |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| $x^3 \cdot e^x$   | har <b>IKKE</b> stamfunktionen | $\frac{1}{4}x^4 \cdot e^x$ |
| $\frac{x^3}{e^x}$ | har <b>IKKE</b> stamfunktionen | $\frac{1}{4}x^4$<br>$e^x$  |
| $5 \cdot e^x$     | har <b>IKKE</b> stamfunktionen | $5x \cdot e^x$             |

## 8. Bestem $\int f(x) dx$ uden hjælpemidler.

### Opgave

Bestem  $\int 6x^2 dx$ .

### Besvarelse

$$\int 6x^2 dx = 6 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + c = 6 \cdot \frac{1}{3} x^3 + c = \underline{\underline{2x^3 + c}}.$$

## 9. Find en bestemt af stamfunktionerne.

### Opgave 9.1 (Vi kender et punkt på stamfunktionens graf)

$F$  er en stamfunktion til  $f(x) = 2x + 3$ .

Det er oplyst at: Grafen for  $F$  går gennem punktet  $(-1, -6)$ . Find  $F$ .

I nogle opgaver er denne oplysning formuleret sådan:  $F(-1) = -6$ .

#### Besvarelse uden hjælpemidler.

Da  $F$  er en stamfunktion til  $f(x) = 2x + 3$ , findes en konstant  $c$  så

$$F(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 + 3 \cdot x + c = x^2 + 3x + c$$

Da grafen for  $F$  går gennem punktet  $(-1, -6)$ , må

$$(-1)^2 + 3 \cdot (-1) + c = -6$$

$$1 - 3 + c = -6$$

$$-2 + c = -6$$

$$c = -6 + 2$$

$$c = -4$$

dvs.

$$\underline{\underline{F(x) = x^2 + 3x - 4}}, \quad -\infty < x < \infty$$

Når vi indsætter et grafpunkts  $x$ -koordinat i forskriften og regner ud, så får vi grafpunktets  $y$ -koordinat.

#### Besvarelse med hjælpemidler.

$F$  er den stamfunktion til  $f(x) = 2x + 3$  hvis graf går gennem punktet  $(-1, -6)$ .

$$F(x) = \int (2 \cdot x + 3) dx = x^2 + 3 \cdot x + c \quad \text{udregnet af Nspire}$$

$$(-1)^2 + 3 \cdot (-1) + c = -6 \quad \text{da } F\text{-graf går gennem } (-1, -6)$$

Nspire løser ligningen  $(-1)^2 + 3 \cdot (-1) + c = -6$  mht.  $c$  og får  $c = -4$

$$\text{solve}((-1)^2 + 3 \cdot (-1) + c = -6, c) \rightarrow c = -4$$

$$F(x) = x^2 + 3 \cdot x + (-4) \quad \text{dvs.} \quad F(x) = x^2 + 3 \cdot x - 4, \quad -\infty < x < \infty$$

### Opgave 9.2 (Vi kender en linje der er tangent til stamfunktionens graf)

$F$  er en stamfunktion til  $f(x) = 2x + 3$ .

Det er oplyst at: Linjen med ligningen  $y = x - 5$  er tangent til grafen for  $F$ . Find  $F$ .

#### Besvarelse

Da  $F$  er en stamfunktion til  $f(x) = 2x + 3$ , findes en konstant  $c$  så

$$F(x) = x^2 + 3x + c$$

Først udregner vi et punkt der ligger på grafen for  $F$ , nemlig det punkt  $(x_0, y_0)$  hvori tangenten rører grafen.

Af tangentens ligningen  $y = x - 5$  ser vi at tangenthældningen er 1:

$$F'(x_0) = 1$$

$$2x_0 + 3 = 1$$

$$x_0 = -1$$

Da  $x_0 = -1$  og  $(x_0, y_0)$  ligger på linjen med ligningen

$$y = x - 5$$

får vi

$$y_0 = (-1) - 5$$

$$y_0 = -6$$

Nu kender vi et punkt på grafen for  $F$ . Så kan vi bruge metoden fra opgave 9.1.

Når vi indsætter et grafpunkts  $x$ -koordinat i forskriften for differentialkvotienten og regner ud, så får vi grafpunktets tangenthældning.

At en linjes ligning er  $y = ax + b$  betyder at for et punkt på linjen kan vi udregne  $y$ -koordinaten ved at gange  $x$ -koordinaten med  $a$  og lægge  $b$  til resultatet.

## 10. Hvad er en arealfunktion?

Den viste graf er på en skærm.


Når vi trækker  $x$ -prikken mod højre, bliver det grå område større.

$A(x)$  er arealet af det grå område.

$A(x)$  kaldes arealfunktionen for  $f$ .

På billedet ser vi at

$$A(9) = 36 \quad \text{og} \quad A(11) = 53 .$$



## 11. Vigtig regel om arealfunktioner.

Når

$A(x)$  er arealfunktionen for en ikke-negativ funktion  $f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$

så gælder at

$A(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$

dvs.

$$A'(x) = f(x)$$

Betyder at grafen ligger på eller over  $x$ -aksen.

# Bestemt integral

## 12. Hvad er det bestemte integral.

Det bestemte integral fra  $a$  til  $b$  af  $f(x)$  er tallet

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

hvor  $F(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$ .

Det bestemte integral er et tal.

Det ubestemte integral er funktioner.

## 13. Udregn $\int_a^b f(x) dx$ med Nspire.

På skabelon-paletten vælger vi integralskabelonen

$$\int_{\square}^{\square} (\square) d\square$$

### Eksempel

$$\int_{-1}^4 (6x^2 - 5) dx = 105 \quad \text{udregnet med Nspire}$$

**Husk** at skrive dette!

## 14. Udregn $\int_a^b f(x) dx$ uden hjælpemidler.

Når vi udregner bestemte integraller uden hjælpemidler, er det praktisk at bruge

symbolet  $[F(x)]_a^b$  som betyder  $F(b) - F(a)$

Fordelen er at vi kan skrive stamfunktionen inden vi indsætter grænserne  $a$  og  $b$  for  $x$ .

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 (6x^2 - 5) dx &= [2x^3 - 5x]_{-1}^4 \\ &= (2 \cdot 4^3 - 5 \cdot 4) - (2 \cdot (-1)^3 - 5 \cdot (-1)) \\ &= 105 \end{aligned}$$

I den kantede parentes  $[ ]$  skal stå en **stamfunktion** til udtrykket efter integraltegnet  $\int$ .

Kontrollér at  $(2x^3 - 5x)' = 6x^2 - 5$

Den **øvre grænse** 4 skal sættes ind for  $x$  i **første parentes**, den **nedre grænse** -1 i **sidste parentes**.



# Areal og bestemt integral

## 15. Regel om bestemt integral og areal.

**Regel** om bestemt integral og areal:


Hvis

$$f(x) \geq 0 \text{ for } a \leq x \leq b \text{ og}$$

$M$  er området mellem  $f$ -graf og  $x$ -aksen  
i intervallet  $a \leq x \leq b$

så gælder

$$\int_a^b f(x) dx = \text{arealet af } M$$



## 16. Bevis for regel om bestemt integral og areal.

**Bevis**

$F(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$ .

$A(x)$  er arealfunktionen for  $f(x)$ , så  $A(x)$  er en stamfunktion til  $f(x)$ .

Da  $A(x)$  og  $F(x)$  er stamfunktion til samme funktion, findes en konstant  $c$  så

$$(*) \quad A(x) = F(x) + c.$$

Nu fås

$$\text{areal af } M = A(b)$$

$$= A(b) - A(a)$$

$$= (F(b) + c) - (F(a) + c)$$

$$= F(b) - F(a)$$

$$= \int_a^b f(x) dx$$

Ifølge definitionen på arealfunktion.

Da  $A(a) = 0$ .

Ifølge (\*).

Ifølge definitionen på bestemt integral.

Hermed har vi bevist reglen i ramme 15.

## 17. Fortolk integral.

I en opgave er  $f(x) = -3x - x^2$

Vi har udregnet at  $\int_{-1}^0 f(x) dx = \frac{7}{6}$

Vi skal give en **fortolkning** af dette tal.


Svar på dette spørgsmål:

Da  $f(x) \geq 0$  for  $-1 \leq x \leq 0$ , gælder:

$\int_{-1}^0 f(x) dx$  er arealet mellem  $f$ -graf og  $x$ -aksen i intervallet  $-1 \leq x \leq 0$

så  $\frac{7}{6}$  er arealet mellem  $f$ -graf og  $x$ -akse i intervallet  $-1 \leq x \leq 0$

dvs.  $\frac{7}{6}$  er arealet af det grå område .




## 18. Kvadrant.

I opgaver hvor vi skal bestemme arealer, kan der stå ordet **kvadrant**.

Koordinataksene deler planen op i fire kvadranter.

Figuren viser hvad de fire kvadranter hedder.



## 19. Areal mellem graf og x-akse uden hjælpemidler.

### Opgave


Figuren viser grafen for funktionen

$$f(x) = 4 - x^2$$

og linjen med ligningen  $x = -1$ .

Grafen for  $f$  skærer x-aksen i punkterne  $(-2, 0)$  og  $(2, 0)$ .

Bestem arealet af det grå område.



**Besvarelse** indeholder ovenstående oplysninger samt følgende:

Det grå område er

området mellem grafen for  $f$  og x-aksen i intervallet  $-1 \leq x \leq 2$ .

Da  $f(x) \geq 0$  i dette interval, er arealet

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 (4 - x^2) dx &= \left[ 4x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \left( 4 \cdot 2 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 \right) - \left( 4 \cdot (-1) - \frac{1}{3} \cdot (-1)^3 \right) \\ &= 8 - \frac{8}{3} - \left( -4 + \frac{1}{3} \right) \\ &= 8 - \frac{8}{3} + 4 - \frac{1}{3} \\ &= 9 \end{aligned}$$

Tallet  $-1$  nederst på  $\int$  er områdets venstre grænse.

Tallet  $2$  øverst på  $\int$  er områdets højre grænse.

I den kantede parentes  $[ ]$  skal stå en **stamfunktion** til udtrykket efter integraltegnet  $\int$ .

Kontrollér at  $(4x - \frac{1}{3}x^3)' = 4 - x^2$

Det er den **øverste grænse**  $2$  der skal indsættes for  $x$  i den **første parentes**.

Den **nederste grænse**  $-1$  skal indsættes for  $x$  i den **sidste parentes**.

Arealet af det grå område er  $9$ .

## 20. Areal mellem graf og x-akse med hjælpemidler.

### Opgave 20

En funktion er bestemt ved  $f(x) = -x^2 + 2x + 8$ .

Grafen afgrænser i første kvadrant sammen med koordinataksler et område  $M$ .

Bestem arealet af  $M$ .

### Svar 1 på opgave 20: Grundlæggende metode. Skal kunnes.

|   |  |
|---|--|
| <p>Vi taster forskriften <math>f(x) = -x^2 + 2x + 8</math> og får Nspire til at tegne grafen.</p> <p>Grafen afgrænser i første kvadrant sammen med koordinatakslerne et område <math>M</math>.</p> <p>Nspire løser ligningen <math>-x^2 + 2x + 8 = 0</math> mht. <math>x</math> og får <math>x = -2</math> or <math>x = 4</math>.</p> <p><math>\text{solve}(-x^2 + 2 \cdot x + 8 = 0, x) \rightarrow x = -2</math> or <math>x = 4</math></p> <p>Dette viser hvor grafen skærer x-aksen.</p> <p>Af figuren ser vi nu at <math>M</math> er arealet mellem graf og x-akse i intervallet <math>0 \leq x \leq 4</math>.</p> <p>Dette areal er</p> $\int_0^4 (-x^2 + 2 \cdot x + 8) dx = \frac{80}{3} \quad \text{Udregnet af Nspire}$ <p>Arealet af <math>M</math> er <math>\frac{80}{3}</math>.</p> |  |
|---|--|

### Svar 2 på opgave 20: Metode hvor $f(x)$ defineres. Skal ikke kunnes.

|  |  |
|--|--|
| <p>Vi taster forskriften <math>f(x) := -x^2 + 2 \cdot x + 8</math> <math>\rightarrow</math> Udført og får Nspire til at tegne grafen.</p> <p>Grafen afgrænser i første kvadrant sammen med koordinatakslerne et område <math>M</math>.</p> <p>Nspire løser ligningen <math>f(x) = 0</math> mht. <math>x</math> og får <math>x = -2</math> or <math>x = 4</math>.</p> <p><math>\text{solve}(f(x) = 0, x) \rightarrow x = -2</math> or <math>x = 4</math></p> <p>Dette viser hvor grafen skærer x-aksen.</p> <p>Af figuren ser vi nu at <math>M</math> er arealet mellem graf og x-akse i intervallet <math>0 \leq x \leq 4</math>.</p> <p>Dette areal er</p> $\int_0^4 f(x) dx = \frac{80}{3} \quad \text{Udregnet af Nspire}$ <p>Arealet af <math>M</math> er <math>\frac{80}{3}</math>.</p> |  |
|--|--|

Opgave 20 fortsætter på næste side!

**Svar 3 på opgave 20: Metode hvor graf bruges. Skal ikke kunnes. God til kontrol og illustration.**


Vi taster forskriften  $f(x) = -x^2 + 2 \cdot x + 8$

og får Nspire til at tegne grafen.

Grafen afgrænser i første kvadrant sammen med koordinataksene et område  $M$ .

1. Vælger: undersøg graf med hensyn til integral.
2. Taster 0 (da  $x=0$  ved venstre kant af  $M$ ).
3. Fører markør til højre skæring med  $x$ -akse (så udregnes  $x$  ved højre kant af  $M$ )
4. Trykker på Enter-tast og får areal = 26.6667 .

Areal af  $M$  er 26.7 .




## 21. Areal mellem to grafer, 1. eksempel.

I nogle opgaver skal et areal udregnes ved at udregne to arealer og trække det ene fra det andet.

Vi har tegnet graferne for funktionerne  $f(x) = 4\sqrt{x}$  og  $g(x) = 12 - x$

Vi vil udregne arealet af det grå område  $V$  på venstre figur.



Vi løser ligningen  $4\sqrt{x} = 12 - x$  og får  $x = 4$ , så grafernes skæringspunkt har  $x$ -koordinat 4.

Det grå område  $M$  på midterste figur har arealet  $\int_0^4 (12 - x) dx = 40$  udregnet med Nspire

Det grå område  $H$  på højre figur har arealet  $\int_0^4 4\sqrt{x} dx = \frac{64}{3}$  udregnet med Nspire

Hvis vi fjerner  $H$  fra  $M$ , får vi  $V$ , så arealet af  $V$  er  $40 - \frac{64}{3} = \underline{\underline{\frac{56}{3}}}$

## 22. Areal mellem to grafer, 2. eksempel.

### Opgave

Der er givet funktionerne  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x$  og  $g(x) = -0,1x + 2$ .

Bestem arealet af det område der afgrænses mellem graferne for  $f$  og  $g$ .

**Besvarelse** indeholder ovenstående oplysninger samt følgende:

For at finde  $x$ -koordinater til skæringspunkter mellem grafer lader vi Nspire løse ligningen

$$-\frac{1}{4}x^2 + 2x = -0,1x + 2 \quad \text{og får } x = 1,09517 \quad \text{eller } x = 7,30483 .$$

Se figur nedenfor til venstre.

areal mellem  $f$ -graf og  $g$ -graf =


(areal mellem  $f$ -graf og  $x$ -akse) – (areal mellem  $g$ -graf og  $x$ -akse) =

$$\int_{1,09517}^{7,30483} \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2x\right) dx - \int_{1,09517}^{7,30483} (-0,1x + 2) dx =$$


9,97687 *udregnet med Nspire*

Dvs.

Arealet af det område der afgrænses mellem graferne for  $f$  og  $g$  er 9,98.



Figur til ramme 22



Figur til ramme 23

## 23. Areal mellem to grafer, 3. eksempel.

### Opgave

Der er givet funktionerne  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x$  og  $g(x) = -0,1x + 2$ .

Bestem arealet af det område der afgrænses mellem graferne for  $f$  og  $g$  i intervallet  $[3 ; 6]$ .

**Besvarelse** indeholder ovenstående oplysninger samt følgende:

Se figur ovenfor til højre.

areal mellem  $f$ -graf og  $g$ -graf i  $[3 ; 6]$  =

(areal ml.  $f$ -graf og  $x$ -akse i  $[3 ; 6]$ ) – (areal ml.  $g$ -graf og  $x$ -akse i  $[3 ; 6]$ ) =

$$\int_3^6 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2x\right) dx - \int_3^6 (-0,1x + 2) dx =$$

6,60000 *udregnet med Nspire*

Dvs.

Arealet af det område der afgrænses mellem graferne for  $f$  og  $g$  er 6,60.


# Andre anvendelser

## 24. Andre anvendelser.

Hvis I i en eksamensopgave skal bruge integral til at udregne andet end graf-afgrænset areal, så vil der i opgaven stå den integralformel I skal bruge. I skal så finde ud af at sætte tal ind i integralformlen. Måske skal I først udregne disse tal. Det I skal udregne med et integral kan både være geometriske størrelser og størrelser fra f.eks. naturvidenskab eller samfundsfag.

**Opgave 24.1:** Figuren viser en gavl. Langs den buede kant er et rødt lysstofrør der har form som en del af grafen for  $f(x) = -x^2 + 8x - 12$ . Gavlens bredde er 2 m. Det oplyses at buelængden af grafen for en funktion  $f$  i et interval  $a \leq x \leq b$  er  $\int_a^b \sqrt{f'(x)^2 + 1} dx$ . Bestem længden af lysstofrøret.

**Overvejelser:**  $f(x) = 0$  har løsningerne 2 og 6 så  $a = 2$ . Hertil lægger vi gavlens bredde og får  $b = 4$ . Da  $f'(x) = -2x + 8$ , skal der under rodtegnet stå  $(-2x + 8)^2 + 1$ .



**Opgave 24.2:** Et punkt på en skærm bevæger sig sådan at  $h(t) = 2 + 0,3t$  hvor  $h(t)$  er hastigheden (mm pr. sekund)  $t$  sekunder efter at punktets bevægelse startede. Længden  $l$  af det stykke punktet bevæger sig i de første  $p$  sekunder, kan beregnes ved hjælp af formlen  $l = \int_0^p h(t) dt$ .

Hvor langt bevæger punktet sig i tidsrummet fra 3 til 8 sekunder efter start?

**Overvejelser:** Længden af det stykke punktet bevæger sig de første 3 sekunder, må være  $\int_0^3 (2 + 0,3t) dt$ . På tilsvarende måde udregner vi længden af det stykke punktet bevæger sig de første 8 sekunder. Forskellen på de to længder må være svaret på spørgsmålet.